

# **AVERTISSEMENTS**

PRATIQUES AGRICOLES









### REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n° 25 du 13 Septembre 2000- 1 page

# COLZA: Stade A à B5 Ravageurs

**GROSSES ALTISES** 

Le vol n'a pas débuté.

#### **PETITES ALTISES**

Des piqures importantes sont parfois observées sur colzas ieunes. notamment en bordure de repousses. Seul le dégât direct des adultes par piqures est à prendre en compte. les pontes étant déposées sur cultures de printemps.

Intervenir avec une pyréthrinoïde si vous avez 30 % des pieds porteurs de piqûres avant le stade B2.

#### TENTHREDES

Les captures d'adultes en cuvettes jaunes sont très abondantes (+ de 500 sur 8 cuvettes). Les premiers dégâts de larves sont signalés sur les parcelles les plus avancées (B4-B6) et sur repousses.

Intervenir sur larves avec une pyréthrinoïde, dès l'apparition des premiers dégâts.

#### **PUCERONS**

Ils sont absents pour l'instant.

# **Maladies**

#### **PHOMA**

La maturation des périthèces progressé de façon sensible depuis une semaine, son évolution sera précisée dans les prochains bulletins.

Comme annoncée dans la note commune SRPV-CETIOM du 10/08. l'évolution du risque parcellaire est résumée dans la grille ci-dessous (en fonction de la variété, du stade, de la vitesse de croissance et du sol).

RISQUE	VARIETE	STADE MAXI	SOL Limon Argilo-calcaire	
Elevé	Pronto, Cocktail, Bristol, Elite, Synergy	B6		
* Selon vitesse de croissance	Bristol, Synergy, Elite, Pronto, Cocktail	B6		
* Selon vitesse de croissance	Goéland, Adélie, Colosse, Ascona, Capitol, Carolus, Madrigal, Eliot	B4	Limon	
Très faible	Zénith, Canary, Constant, P	ollen, Cando		

Service Régional de la Protection des Végétaux 13 route de la Fo 86580 BIARD 2 : 05.49.62.98.25 Fax: 05.49.62.98.26

Imprime à la station d'Avertissements Agricoles POITOU-CHARENTES

Le Directeur-Gérant **'UILLARD CONDAT** 

Publication périodique

C.P.P.A.P. nº 2139 AD ISSN n°02294 470

\* risque élevé si croissance ralentie, risque très faible si croissance rapide. Parcelles à risque très faible : intervention déconseillée. Parcelles à risque élevé : intervention conseillée au TOP avertissement éventuel si le stade maxi n'est pas dépassé.

COLZA

Phoma: Grille de risque.

Tenthrèdes: Nombreuses captures, 1ers dégâts

# Insecticides utilisables sur ravageurs du colza à l'automne

matières actives	Spécialités commerciales	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Pucerons	Tenthrède
alphaméthrine	Fastac Bestseller 100, Althrine Mageos MD Clameur, Vorax MD, Astor MD Vorax, Astor Agrozip	0,15 I 0,075 I 0,05 kg 0,05 kg 0,075 I 0,075 I	0,15 l 0,05 kg 0,05 kg 0,075 l 0,075 l		
betacyfluthrine	Ducat, Cajun	0,3 1	0,3 1	0,3 1	
bifenthrine	Talstar Expérid Talstar flo, Brigade, Bistar	0,075 I 0,075 I 0,1 I	0,075 I 0,075 I 0,1 I	0,075 I 0,1 I	0,075 I 0,075 I 0,1 I
cyfluthrine	Baythroïd, Blocus, Bourrasque Zapa	0,3 I 0,3 I	0,3 I 0,3 I	0,3 I 0,3 I	
cyperméthrine	Nombreuses spécialités (1)	25 g m.a	7		20 g m.a
deltaméthrine	Nombreuses spécialités (1)	5 g m.a	5 g m.a	6,25 g m.a	7,5 g m.a
esfenvalérate	Sumi alpha, Mandarin	0,6 1			
lambda-cyhalothrine	Karaté vert Karaté Xpress	0,1 I 0,1 kg	0,15 l 0,15 kg	0,15 l 0,15 kg	0,1 l 0,1 kg
Tau-fluvalinate	Mavrik flo, Mavrik	0,2 1		0,2 1	
tralométhrine	Tracker 108 EC	0,065 1	0,065 I		
zétacyperméthrine	Deumil, Fury	0,1	0,1		100
cyperméthrine + endosulfan	Cyperfan 215 EC, Orfis	0,8 I			
deltaméthrine + endosulfan	Galion	0,81	0,81		0,81
betacyfluthrine + oxydéméton-méthyl	Enduro, Full M			0,5 1	
deltaméthrine + pyrimicarbe	Best, Status, Jusan CL			1,25	
lambda-cyhalothrine + pyrimicarbe	Karaté K, Open, Okapi GF			1,25	
esfenvalerate + pyrimicarbe	Kabuto, Kanji			1,25	
esfenvalerate + oxydéméton-méthyl	Sumiton			0,51	
tau-fluvalinate + thiométon	Mavrik B, Mavrik systo			0,41	
triazamate	Aztec, Doctus			0,5	
pyrimicarbe	Pirimor G			0,5 kg	
endosulfan	Nombreuses spécialités (1)	262 g m.a			
endosulfan + parathion éthyl	Drifène AP	0,75 I			
endosulfan + thiométon	Serk EC			1,5	
malathion	Drivox 50	1,5			
méthidathion	Ultracide 20 bouillie ou liquide	250 g m.a			
parathion éthyl + méthyl	Nombreuses spécialités (1)	200 g m.a			
phosalone	Zolone flo, Zolone liquide			600 g m.a	
Phosalone + parathion méthyl	Taxylone	0,751			

Liste arrêtée au 1eravril 2000

(1) : dose exprimée en gramme de matière active par hectare

\*

\*

P147